

Producto Metalaxil 240
Presentación Etiqueta 1 lt
Medida 276 x 146 mm.



27.6 cm

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y manteniéndose perfectamente cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

- PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
 - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
 - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
 - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
 - NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
 - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
 - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
 - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
 - NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
 - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
 - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Sacar al accidentado del lugar donde se intoxicó y colocarlo en un lugar fresco y ventilado. Quitar de inmediato la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que fueron afectadas (sin embargo, debe mantenerse al paciente bien cobijado). Por ningún motivo dar al paciente aceite de ricino, leche, huevos, mantequilla o bebidas alcohólicas, ya que estos aumentan la absorción del veneno. Si es necesario, aplicar respiración artificial.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo químico: METALAXIL 240 CE pertenece al grupo químico de las Fenilamidas.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No tiene antídoto específico por lo cual el tratamiento deberá ser sintomático.
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, náuseas, diarrea y vómito.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
●DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. ●MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. ●EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). ●EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA. ●REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:
ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS Y AVES) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: AG KEM S.A. DE C.V. solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

USO AGRÍCOLA



METALAXIL
Fungicida / Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% En Peso
INGREDIENTE ACTIVO: Metalaxil: metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato (Equivalente a 242 g de i.a./L a 20°C)	25.10
INGREDIENTES INERTES: Disolvente y emulsificantes.	74.90
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-FUNG-0324-328-009-025

CONTENIDO NETO:
1L



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
AG KEM S.A. de C.V.
Blvd. Puerta de Hierro 5153,
Piso 2, Oficina 219
Col. Puerta de Hierro,
Fracc. Paseo Andares,
45116 Zapopan, Jal.

“HECHO EN CHINA”



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADAS
INSTRUCCIONES DE USO ● ¡SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN!

METALAXIL 240 CE es un fungicida sistémico, eficaz contra las enfermedades de cuello y raíz producidas por hongos pertenecientes al género *Phytophthora* spp.

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES	APLICACIÓN
Chile, Berenjena, Jitomate, Tomate Verde, Papa, Pimiento morrón, Okra (7)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5 – 1.25	Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, en el follaje en un volumen de 450 L de agua/ha.	Foliar
Piña (15)	Putridión del corazón (<i>Phytophthora parasitica</i>)	0.5 – 1.25	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 15 días, al cogollo de la planta, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, en un volumen de aplicación de 500 L de agua/ha.	
Aguate (28)	Tristeza del aguacate (<i>Phytophthora cinnamomi</i>)	2-4	Realizar 3 aplicaciones al suelo, al contorno del árbol a intervalo de 15 días; cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, en un volumen de aplicación 500 – 600 L de agua/ha.	
Limon, Naranja, Toronja, Lima, Tangerino, Pomelo, Cídro (21)	Gomosis de los cítricos (<i>Phytophthora parasitica</i>)	50 – 100 mL/100 L de agua.	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 15 días, al suelo (contorno del árbol), cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, en un volumen de aplicación de 400 – 600 L de agua/ha.	
Chile (7) Berenjena (7)	Damping-off o ahogamiento (<i>Phytophthora capsici</i>)	10 a 15 5.0	Aplique METALAXIL 240 CE al momento de la siembra en suficiente cantidad de agua (200 a 500 litros), para obtener una cobertura uniforme. Si no se espera lluvia antes de que las plantas continúen su desarrollo, el METALAXIL 240 CE debe ser incorporado mecánicamente antes de la siembra o ser translocado a la zona radicular después del trasplante con un riego de 5 a 15 cm. Después de la primera aplicación, deben realizarse de 1 a 2 aplicaciones adicionales, dirigidas a la base de la planta, la dosis será de 5.0 L/ha, a intervalos de 30 días. La aplicación debe cubrir los 15 a 20 cm de suelo en ambos lados de la planta.	En drench

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 12 horas después de la aplicación.
MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de METALAXIL 240 CE a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato. La aplicación de este producto se realiza en forma de aspersión dirigida a la base del cuello de la planta; posteriormente debe realizarse un riego para promover que el producto sea incorporado a la zona radicular. **CONTRAINDICACIONES:** No aplicar METALAXIL 240 CE más de 4 veces por temporada y alternar con fungicidas de contacto. No aplique METALAXIL 240 CE en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta.
FITOTOXICIDAD: METALAXIL 240 CE no es fitotóxico en las dosis y en los cultivos aquí recomendados.
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar METALAXIL 240 CE con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desconoce la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá hacer con aquellos productos que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

14.6 cm



PRECAUCIÓN

