




**RSCO-FUNG-0386-X0372-064-23.75**  
Fungicida / Suspensión Concentrada



#### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% En Peso

##### INGREDIENTES ACTIVOS:

###### Azoxystrobina:

Metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-  
3-metoxiacrilato  
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)

23.75%

##### INGREDIENTES INERTES:

Tensoactivo, surfactantes, anticongelante y disolventes

76.25%

**TOTAL: 100 %**

**LANDER 250 SC** es un fungicida para el control de las plagas que se indican en los cultivos descritos en la presente ficha técnica

#### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad.

Abra el envase de **LANDER 250 SC** utilizando el equipo de protección: overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, guantes de neopreno, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra vapores y botas de neopreno.

Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, mida con una probeta de plástico la cantidad de **LANDER 250 SC** a utilizar y adicione la dosis completa, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura de área a tratar.

**CONTRAINDICACIONES.** Evite aplicar **LANDER 250 SC** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28°C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

**FITOTOXICIDAD.** **LANDER 250 SC** no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD.** **LANDER 250 SC** no deberá mezclarse con otros productos agroquímicos.

## MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación, evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferente modo de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo. Llamar inmediatamente al médico.

Si ha ocurrido contacto con la piel, lavar con agua y jabón por 15- 20 minutos.

Si existe contacto del producto con los ojos, lávese con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si los síntomas persisten, acudir al médico.

En caso de ingestión asegúrese de que la persona pueda respirar sin dificultad, si está inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llamar inmediatamente al médico.

**Puede ser nocivo en caso de ingestión**  
**Puede ser nocivo por el contacto con la piel**  
**Puede ser nocivo si se inhala**

## ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

Grupo químico de **LANDER 250 SC**: Estrobilurina

No existe antídoto específico, por lo que, en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático, vigilar signos vitales.

## RECOMENDACIONES DE USO

Utilice **LANDER 250 SC** de acuerdo a las siguientes instrucciones:

| CULTIVO                                                                                                      | PLAGAS                                             | DOSIS<br>(L / ha) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berenjena, Chile, Jitomate (Tomate rojo), Tomate de cáscara (Tomate verde), Okra, Papa, Pimiento morrón (SL) | Tizón temprano<br>( <i>Alternaria solani</i> )     | 0.5 – 0.7         | Realizar dos aplicaciones foliares, a intervalo de 7 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.                                                    |
| Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo, Trigo, Triticale (35)                                            | Tizón foliar<br>( <i>Helminthosporium maydis</i> ) | 0.5 – 0.6         | Realizar dos aplicaciones foliares, a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad y la incidencia y severidad sea menor a 5%; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha. |