



SHAO 200

RSCO-HEDE-0244-X0312-013-25.0
Dicloruro de Paraquat (uso restringido)
Herbicida / Solución Acuosa

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% En Peso

INGREDIENTES ACTIVOS:

Piraclostrobina:

metil {2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil] fenil} (metoxi)
 carbamato
 (Equivalente a 250 g i.a./L, 20°C)

25.00 %

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificante, dispersante y solventes

75.00%

TOTAL: 100 %

SHAO 200 (dicloruro de paraquat al 25 %) es un herbicida por el contacto amplio espectro, formulado como solución acuosa para uso en los cultivos abajo mencionados. Es un herbicida para control rápido de malezas, sin efecto residual en el suelo.


MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Siempre use el equipo de protección: gorra impermeable, botas y guantes de neopreno, overol de algodón, lentes de seguridad o careta protectora y mascarilla con respirador.

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, mida el producto a utilizar con una probeta graduada.

Aplicación: Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separa prepare una pre-mezcla con poca agua y vierta la cantidad de producto requerida de acuerdo a las dosis aquí recomendadas de **SHAO 200** (dicloruro de paraquat al 25 %). Una vez que el líquido se diluya por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar. En aplicación terrestre con aspersora manual o de tractor, aplicar un volumen de 250 – 350 L/ha de agua. Por su modo de acción, requiere utilizar un surfactante no iónico al 0.5 % para asegurar una mejor penetración.

Generalmente, el producto controla totalmente a la maleza en cuatro o cinco días sin afectar a los posteriores cultivos por residuos en el suelo. **SHAO 200** (dicloruro de paraquat al 25 %) es absorbido rápidamente por lo tejidos vegetales y esto evita el lavado por la lluvia.



CONTRAINDICACIONES. No aplicar en horas de calor intenso ni con vientos mayores de 10 km/h, para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. Evite que la aspersión se desvíe a otros cultivos, el ingrediente activo (dicloruro de paraquat) destruye tejidos verdes.

Evite asperjar los tejidos no leñosos de los cultivos. **SHAO 200** (dicloruro de paraquat al 25 %) no causa daños al asperjarlo sobre la corteza madura, pero causará daños si se aplica sobre las partes verdes de las plantas cultivadas. En los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos no aplique a la corteza inmadura del tronco o a los tallos.

FITOTOXICIDAD. **SHAO 200** (dicloruro de paraquat al 25 %) no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Evite el contacto con el follaje de las plantas deseable para no causar efectos fitotóxicos. Hacer las aplicaciones en forma dirigida a las malezas, ya que no es un herbicida selectivo.

INCOMPATIBILIDAD. **SHAO 200** (dicloruro de paraquat al 25 %) no deberá mezclarse con algún otro agroquímico para su aplicación; sin embargo, si desea mezclar deberá usar productos agroquímicos registrados autorizados para los cultivos recomendados en esta etiqueta y realizar una prueba previa de compatibilidad.

PRIMEROS AUXILIOS. Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:

Inhalación: Si es inhalado, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, quite al paciente la ropa contaminada y los zapatos de ser necesario, lave la parte afectada con abundante agua limpia y jabón para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Si fue ingerido: No provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca a una persona inconsciente o semiinconsciente.



**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO. El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de los síntomas y condición clínica.

CULTIVO	Malezas Nombre común	Nombre científico	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Platano ¹ , Café ¹ , Papaya ¹ , Aguacate ¹ , Manzano ¹ , Peral ¹ , Cítricos ¹ , Durazno ¹ , Nogal ¹ , Alfalfa ¹ , Papa ² , Pepino ² , Lechuga ² , Melón ² , Col ² , Soya ² , Sandía ² , Jitomate ² , Caña de azúcar ² , Maíz ² , Cártamo ² , Girasol ² , Chicharo ² , Cebolla ² , Espárrago ² , Frijol ² , Brócoli ² , Zanahoria ² , Coliflor ² , Calacita ² (SL)	Zacate grama Pata de gallina Zacate pinto Zacate Johnson Avena loca Acahuallillo Quintonil Lechosa Verdolaga Quelite Quelite cenizo	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Echinochloa colona</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Avena fatua</i> <i>Simsia amplexicaulis</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Euphorbia</i> sp. <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus</i> sp. <i>Chenopodium album</i>	1.5 – 3.0	Aplicación dirigida a la maleza ¹ Aplicación post-emergencia a la maleza ² Aplicación pre-emergencia al cultivo Volumen de aplicación 250-350 L/ha
Aguacate ¹ , Plátano ¹ (SL)	Alpistillo Higuerilla Lengua de pájaro Girasol Quesito Trébol dulce	<i>Phalaris minor</i> <i>Ricinus communis</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Helianthus annuus</i> <i>Anoda cristata</i> <i>Mellilotus indica</i>	1.5 – 3.0	
Aguacate ¹ , Avena ² , Cafeto ¹ , Caña de azúcar ² , Cítricos ¹ , Durazno ¹ , Maíz ² , Manzano ¹ , Nogal ¹ , Guayabo ¹ (SL)	Malva	<i>Sida acuta</i>	1.5 – 3.0	
Aguacatero ¹ , Cafeto ¹ , Cítricos ¹ , Durazno ¹ , Guayabo ¹ , Manzano ¹ , Nogal ¹ , Papayo ¹ , Peral ¹ , Plátano ¹ (SL)	Tomatillo	<i>Physalis</i> sp.	1.5 – 3.0	
Aguacatero ¹ , Maíz ² , Plátano ¹ , Sorgo ² (SL)	Nabo silvestre	<i>Brassica campestris</i>	1.5 – 3.0	
Plátano ¹ (SL)	Polígono trepador Oreja de ratón	<i>Polygonum aviculare</i> <i>Sida heredacea</i>	1.5 – 3.0	
Frijol ² (SL)	Malva Arrocillo silvestre Falsa altamisa Acahuallillo Botón de oro Quintonil Malva de quesito Coquillo Sorgo	<i>Sida acuta</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Parthenium hysterophorus</i> <i>Simsia amplexicaulis</i> <i>Melampodium divaricatum</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Malva parviflora</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Sorghum halepense</i>	1.5 – 3.0	

() Intervalo de seguridad: días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.