



RSCO-FUNG-03010-X0400-009-25.0
Fungicida Agrícola / Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% En Peso

INGREDIENTES ACTIVOS:

Piraclostrobina:

metil {2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil] fenil} (metoxi)
 carbamato
 (Equivalente a 250 g i.a./L, 20°C)

25.00 %

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificante, dispersante y solventes

75.00%

TOTAL: 100 %

SLASH 250 Es un fungicida sistémico translaminar de amplio espectro de acción preventiva y curativa. Bloquea el transporte de electrones en la mitocondria de las células del hongo lo cual inhibe la respiración mitocondrial y la formación del ATP, que es esencial en los procesos metabólicos. Impide la germinación de esporas, desarrollo del tubo germinativo y la esporulación. Por otra parte genera efectos como senescencia lenta, hojas más verdes, mayor tolerancia al estrés biótico y abiótico, y uso más eficiente del agua y del nitrógeno.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el uso y manejo de este producto, utilizar el equipo de protección adecuado descrito en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Abra el envase de **SLASH 250** girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello (no use la boca para abrir este envase). Mida con probeta la dosis recomendada y diluya en agua vertiendo la dosis previamente medida. En el equipo de aplicación llenar el tanque de la aspersora hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, posteriormente agregue **SLASH 250** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua mezclando perfectamente el contenido. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla y mantenga en constante agitación. Aplíquese con equipo terrestre, por aspersión, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje.

CONTRAINDICACIONES. **SLASH 250** no deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o esté lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto.



Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD. SLASH 250 no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. No se debe mezclar **SLASH 250** con otros plaguicidas o productos agroquímicos.

ALMACENAMIENTO. Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (L / ha)	OBSERVACIONES
Aguacate (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)	0.5 – 0.75	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 14 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 800 L de agua/ha.
Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Tangerino, Toronja (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>)	0.5 – 0.75	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido (1.75 L de agua / árbol) 700 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Pimiento, Morrón, Tomate verde, Papa (7)	Tizón temprano (<i>Alternaria solanil</i>)	0.4 - 0.6	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.